



## ИНСТРУКЦИЯ по медицинскому применению лекарственного препарата **ГАСТРАЦИД®**

РЕГИСТРАЦИОННЫЙ НОМЕР: П N011015 от 05.05.2011 г.

ТОРГОВОЕ НАЗВАНИЕ: Гастрацид®

МЕЖДУНАРОДНОЕ НЕПАТЕНТОВАННОЕ НАЗВАНИЕ ИЛИ ГРУППИРОВОЧНОЕ НАЗВАНИЕ: Алгелдрат + Магния гидроксид

ЛЕКАРСТВЕННАЯ ФОРМА: таблетки жевательные



### СОСТАВ НА ОДНУ ТАБЛЕТКУ:

#### Действующие вещества:

Магния гидроксид.....	400,00 мг
Алгелдрат (алюминия оксид гидратированный).....	400,00 мг
в пересчете на алюминия оксид.....	214,00 мг
<i>Вспомогательные вещества:</i> маннитол, сорбитол, натрия сахаринат, сахараза, крахмал кукурузный, ароматизатор мятный, магния стеарат.	

### ОПИСАНИЕ:

#### Таблетки круглые.

Таблетки плоские, круглые, со скошенным краем белого или белого с серовато-желтовато-зеленоватым оттенком цвета, с легким запахом мяты, на обеих сторонах гравировка NP на фоне дерева.

#### Таблетки квадратные.

Таблетки плоские, квадратные, со скошенным краем белого или белого с серовато-желтовато-зеленоватым оттенком цвета, с легким запахом мяты, на обеих сторонах гравировка NP на фоне дерева.

ФАРМАКОТЕРАПЕВТИЧЕСКАЯ ГРУППА: антацидное средство.

Код АТХ: A02AX



**ФАРМАКОЛОГИЧЕСКОЕ ДЕЙСТВИЕ:** Комбинированный препарат для устранения изжоги и боли в желудке, действие которого обусловлено входящими в его состав компонентами.

Алгелдрат оказывает антацидное, адсорбирующее, обволакивающее, ветрогонное действие. Магния гидроксид оказывает легкое послабляющее действие.

Препарат нейтрализует свободную соляную кислоту в желудке, снижает активность желудочного сока; инактивирует пепсин и связывает желчные кислоты, попадающие в желудок в результате рефлюкса из 12-перстной кишки, оказывает защитное действие на слизистую оболочку желудка и 12-перстной кишки; ускоряет моторику желудка и всех отделов кишечника. Не вызывает вторичную гиперсекрецию соляной кислоты и алкалоз.



**ФАРМАКОКИНЕТИКА:** абсорбция – низкая.

### ПОКАЗАНИЯ ДЛЯ ПРИМЕНЕНИЯ:

- Язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки в фазе обострения;
- Острый гастрит с повышенной и нормальной секреторной функцией в фазе обострения, острый дуоденит;
- Грыжа пищеводного отверстия диафрагмы, рефлюкс-эзофагит;
- Дискомфорт, изжога и боли в эпигастрии при погрешности в диете, после приема лекарств, в том числе глюкокортикостероидов и нестероидных противовоспалительных препаратов, а также после употребления кофе, никотина, алкоголя.



### ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ ДЛЯ ПРИМЕНЕНИЯ:

Повышенная чувствительность к компонентам препарата. Дефицит сахаразы/изомальтазы, непереносимость фруктозы, глюкозо-галактозная мальабсорбция. Гипофосфатемия, выраженное нарушение функции почек, детский возраст до 10 лет, болезнь Альцгеймера, беременность. *С осторожностью:* в период лактации.



### СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ И ДОЗЫ:

Внутрь. Таблетки следует разжевывать и держать во рту до полного рассасывания.

*Взрослым и детям старше 15 лет:* по 1-2 таблетки 4 раза в сутки через 1 час после еды и вечером перед сном или при возникновении дискомфорта, болей в эпигастрии, изжоги. При язвенной болезни желудка препарат необходимо принять за 30 мин. до приема пищи. Максимальная суточная доза – 12 таблеток.

*Детям от 10 до 15 лет* назначают половину рекомендованной дозы для взрослых.

*Для профилактики* – по 1 таблетке за 15 минут до приема лекарств, раздражающих слизистую оболочку пищевода, желудка и двенадцатиперстной кишки.

Продолжительность лечения не должна превышать 15-20 дней.

105\*148 мм



PANTONE 361 C



Black

**ПОБОЧНОЕ ДЕЙСТВИЕ:**

Запор, тошнота, рвота, боли в желудке спастического характера, изменение вкусовых ощущений, гипермагниемия, гипофосфатемия, гипокальциемия, гиперкальциурия, остеомаляция, остеопороз, гипералюминемия, энцефалопатия, нефрокальциноз, нарушение функции почек, аллергические реакции. У больных с сопутствующей почечной недостаточностью – жажда, снижение артериального давления, гипорефлексия.

**ПЕРЕДОЗИРОВКА:****Симптомы**

Образование камней в почках, появление тяжелых запоров, сонливость, гипермагниемия. Могут наблюдаться также признаки метаболического алкалоза: изменение настроения, онемение или боль в мышцах, нервозность и быстрая утомляемость, неприятные вкусовые ощущения.

**Лечение**

Необходимо сразу предпринять меры по быстрому выведению препарата: промыть желудок, вызвать рвоту, принять активированный уголь.

**ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ДРУГИМИ ЛЕКАРСТВЕННЫМИ СРЕДСТВАМИ:**

Может адсорбировать некоторые лекарственные средства, уменьшая, таким образом, их всасывание. Снижает и замедляет абсорбцию дигоксина, индометасина, салицилатов, хлорпромазина, фенитоина, блокаторов H<sub>2</sub>-гистаминовых рецепторов, бета-адреноблокаторов, дифлунисала, изо니아зида, антибиотиков тетрациклинового ряда, хинолонов (ципрофлоксацина, норфлоксацина, офлоксацина, эноксацина, грепафлоксацина и др.), азитромицина, цефподоксима, пивампициллина, рифампицина, непрямых антикоагулянтов, барбитуратов, фексофенадина, дипиридамола, залцитабина, желчных кислот – хендезоксихолевой и урсодезоксихолевой, пеницилламина, препаратов железа и лития, хинидина, лансопрозола, мексилетина, котоназола.

При одновременном приеме с препаратами, покрытыми кишечнорастворимой оболочкой, повышенная щелочность желудочного сока может привести к ускоренному нарушению оболочки и вызвать раздражение желудка и двенадцатиперстной кишки.

M-холиноблокаторы, замедляя опорожнение желудка, усиливают и удлиняют действие препарата.

**ОСОБЫЕ УКАЗАНИЯ:**

Интервал между приемом препарата Гастрацид® и других лекарственных средств должен составлять 1-2 часа. При более длительном применении (более 20 дней) необходим регулярный врачебный контроль. Препарат содержит сорбитол, который противопоказан при врожденной переносимости фруктозы.

Препарат не оказывает влияния на способность управлять транспортными средствами и занятием другими видами деятельности, требующими концентрации внимания и быстроты психомоторных реакций.

**ФОРМА ВЫПУСКА:**

Таблетки жевательные, 400 мг + 400 мг.

Для круглых таблеток: по 10 таблеток в блистере ПВХ/ПВДХ/Ал; по 1, 2, 3, 4, 5 блистеров в картонной пачке с инструкцией по применению.

Для квадратных таблеток: по 4, 6, 8 таблеток в блистере ПВХ/ПВДХ/Ал; по 1, 2, 3, 4, 5 блистеров в картонной пачке с инструкцией по применению.

**СРОК ГОДНОСТИ:**

3 года.

Не применять по истечении срока годности.

**УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ:**

При температуре не выше 25 °С.

Хранить в недоступном для детей месте!

**УСЛОВИЯ ОТПУСКА:** без рецепта.**ВЛАДЕЛЕЦ РЕГИСТРАЦИОННОГО УДОСТОВЕРЕНИЯ:**

ООО «Бауш Хелс», 115162, г. Москва, ул. Шаболовка, д. 31, стр. 5, Россия.

**ПРОИЗВОДИТЕЛЬ:**

Натур Продукт Фарма Сп. з о.о.,  
ул. Подсточице 30, 07-300 Острев Мазовецка, Польша.

**ОРГАНИЗАЦИЯ, ПРИНИМАЮЩАЯ ПРЕТЕНЗИИ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ:**

ООО «Бауш Хелс»,  
115162, г. Москва, ул. Шаболовка, д. 31, стр. 5, Россия,  
тел./факс: +7 (495) 510-28-79.

406504/1, P1RU02



**Natur  
Produkt**

105\*148 мм



PANTONE 361 C

Black