

Листок-вкладыш – информация для пациента**Неттацин, 0,3 %, капли глазные**

Действующее вещество: нетилмицин

Перед применением препарата полностью прочитайте листок-вкладыш, поскольку в нем содержатся важные для Вас сведения.

Сохраните листок-вкладыш. Возможно, Вам потребуется прочитать его еще раз.

Если у Вас возникли дополнительные вопросы, обратитесь к лечащему врачу.

Препарат назначен именно Вам. Не передавайте его другим людям. Он может навредить им, даже если симптомы их заболевания совпадают с Вашими.

Если у Вас возникли какие-либо нежелательные реакции, обратитесь к лечащему врачу. Данная рекомендация распространяется на любые возможные нежелательные реакции, в том числе на не перечисленные в разделе 4 листка-вкладыша.

Содержание листка-вкладыша

1. Что из себя представляет препарат Неттацин, и для чего его применяют.
2. О чем следует знать перед применением препарата Неттацин.
3. Применение препарата Неттацин.
4. Возможные нежелательные реакции.
5. Хранение препарата Неттацин.
6. Содержимое упаковки и прочие сведения.

1. Что из себя представляет препарат Неттацин, и для чего его применяют

Препарат Неттацин содержит действующее вещество **нетилмицин**, которое относится к группе антибиотиков, называемых *аминогликозидами*. Препарат Неттацин применяется только для закапывания в глаза.

Показания к применению

Препарат Неттацин показан к применению у взрослых и детей в возрасте от 3 лет для лечения инфекции век и наружных отделов глаза, вызванных чувствительными к нетилмицину микроорганизмами.

Если улучшение не наступило или Вы чувствуете ухудшение, необходимо обратиться к врачу.

2. О чем следует знать перед применением препарата Неттацин**Противопоказания****Не применяйте препарат Неттацин:**

- если у Вас аллергия на нетилмицин, другие антибиотики-аминогликозиды (например, гентамицин, тобрамицин, канамицин) или любые другие компоненты препарата (перечисленные в разделе 6 листка-вкладыша);
- если Ваш ребенок младше 3 лет;
- если Вы беременны или кормите грудью.

Особые указания и меры предосторожности

Перед применением препарата Неттацин проконсультируйтесь с лечащим врачом.

Если Вы применяете препарат Неттацин в течение длительного времени, Вы можете стать более восприимчивыми к глазным инфекциям, включая грибковые инфекции. Если Вы

заметили симптомы новой инфекции, обратитесь к лечащему врачу для назначения соответствующего лечения.

Немедленно обратитесь к врачу, если Вы не видите эффекта от применения препарата через несколько дней или у Вас появились признаки аллергии или раздражения глаз (см. раздел 4).

Дети

Препарат противопоказан детям в возрасте до 3 лет.

Другие препараты и препарат Неттацин

Сообщите лечащему врачу о том, что Вы применяете, недавно применяли или можете начать применять какие-либо другие препараты.

Обязательно сообщите врачу, если Вы применяете любой из нижеперечисленных препаратов:

- антибиотики для местного и системного применения (например, стрептомицин, гентамицин, тобрамицин, амикацин, полимиксин В, колистиметат натрия, виомицин, ванкомицин, цефалоридин и др.);
- сильнодействующие диуретики (такие как этакриновая кислота и фуросемид);
- цисплатин (противоопухолевый препарат).

Совместное применение препарата Неттацин и препаратов, перечисленных выше, может привести к усилению побочных эффектов со стороны органа слуха (*ототоксичность*) и почек (*нефротоксичность*).

Если Вы не уверены, применяете ли Вы какой-либо из препаратов, перечисленных выше, спросите об этом у Вашего врача. Вы также должны сообщить врачу, если Вы уже применяете препарат Неттацин, если во время лечения Вам выписали новый лекарственный препарат.

Беременность и грудное вскармливание

Если Вы беременны или кормите грудью, думаете, что забеременели, или планируете беременность, перед началом применения препарата Неттацин проконсультируйтесь с лечащим врачом.

Не применяйте препарат Неттацин во время беременности.

Не применяйте препарат Неттацин при кормлении грудью без консультации с врачом. Если Ваш врач назначит препарат Неттацин во время кормления грудью, грудное вскармливание необходимо прекратить на все время лечения.

Управление транспортными средствами и работа с механизмами

Сразу после применения препарата Неттацин у Вас на некоторое время может возникнуть нечеткость зрения. Не управляйте транспортными средствами и не работайте с механизмами, пока Ваше зрение не восстановится.

Препарат Неттацин содержит бензалкония хлорид

Мягкие контактные линзы могут абсорбировать бензалкония хлорид с изменением их цвета. Перед применением данного лекарственного препарата необходимо снять контактные линзы и надеть обратно спустя 15 минут.

Бензалкония хлорид также способен вызывать раздражение глаз, особенно при их сухости или поражениях *роговицы* (прозрачного слоя передней части глаза). При необычных ощущениях в глазу, покалывании или боли в глазу после применения препарата Неттацин обратитесь к лечащему врачу.

3. Применение препарата Неттацин

Всегда применяйте препарат Неттацин в полном соответствии с рекомендациями лечащего врача. При появлении сомнений посоветуйтесь с лечащим врачом.

Рекомендуемая доза

Рекомендуемая доза составляет 1–2 капли 3 раз в сутки в пораженный глаз (глаза).

Путь и (или) способ введения

Применяйте препарат Неттацин **только** для закапывания в глаза.

Важно применять препарат Неттацин так, чтобы кончик флакона с препаратом не касался глаз, зоны вокруг глаз, пальцев или любой другой поверхности. Эти меры позволят Вам исключить попадание в раствор бактерий, которые вызывают инфекции глаз. Использование загрязненных растворов может привести к серьезному повреждению глаз и потере зрения.

Продолжительность терапии

Длительность лечения определяется лечащим врачом.

Не прекращайте применение препарата Неттацин до окончания периода лечения, установленного Вашим врачом. Если лечение прекращено преждевременно, существует вероятность повторного возникновения инфекции.

При наличии вопросов по применению препарата обратитесь к лечащему врачу.

4. Возможные нежелательные реакции

Подобно всем лекарственным препаратам, препарат Неттацин может вызывать нежелательные реакции, однако они возникают не у всех.

Нежелательные реакции, которые могут наблюдаться при приеме препарата Неттацин.

Часто (могут возникать не более чем у 1 человека из 10):

- жжение в глазах;
- зуд в глазах;
- покраснение конъюнктивы.

Сообщение о нежелательных реакциях

Если у Вас возникают какие-либо нежелательные реакции, проконсультируйтесь с лечащим врачом. Данная рекомендация распространяется на любые возможные нежелательные реакции, в том числе на не перечисленные в листке-вкладыше. Вы также можете сообщить о нежелательных реакциях напрямую через систему сообщений государств – членов Евразийского экономического союза (см. ниже). Сообщая о нежелательных реакциях, Вы помогаете получить больше сведений о безопасности препарата.

Российская Федерация

Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (Росздравнадзор)

Адрес: 109012, г. Москва, Славянская площадь, д. 4, стр. 1

Телефон: +7 800 550 99 03

Электронная почта: pharm@roszdravnadzor.gov.ru или npr@roszdravnadzor.gov.ru

Сайт: www.roszdravnadzor.gov.ru

5. Хранение препарата Неттацин

Храните лекарственный препарат в недоступном для детей месте.

Не применяйте препарат после истечения срока годности (срока хранения), указанного на картонной пачке и этикетке флакона после «Годен до:».

Храните препарат при температуре не выше 25 °С.

После вскрытия флакона препарат следует использовать в течение 28 дней.

Не выбрасывайте (не выливайте) препарат в канализацию или с бытовыми отходами. Уточните у работника аптеки, как следует утилизировать препарат, который больше не потребуется. Эти меры позволят защитить окружающую среду.

6. Содержимое упаковки и прочие сведения

Препарат Неттацин содержит

Действующим веществом является нетилмицин.

100 мл раствора содержит 0,455 г нетилмицина сульфата (что соответствует 0,300 г нетилмицина).

Прочими ингредиентами (вспомогательными веществами) являются: натрия хлорид, бензалкония хлорид, вода очищенная.

Препарат Неттацин содержит бензалкония хлорид (см. раздел 2).

Внешний вид препарата Неттацин и содержимое упаковки

Капли глазные.

Прозрачный бесцветный или слегка желтоватого цвета раствор.

По 5 мл препарата во флакон-капельницу из полиэтилена низкой плотности, укупороженный полистироловым колпачком с пробойником.

По 1 флакону вместе с листком-вкладышем помещают в пачку картонную.

Держатель регистрационного удостоверения и производитель

Италия / Italy

СИФИ С.П.А. / SIFI S.P.A.

Виа Эрколе Патти, 36, 95025, Ачи Сант Антонио (КТ) / Via Ercole Patti, 36, 95025, Aci Sant' Antonio (CT).

За любой информацией о препарате, а также в случаях возникновения претензий следует обращаться к местному представителю держателя регистрационного удостоверения:

Российская Федерация

ООО «Бауш Хелс»

115093, г. Москва, ул. Павловская, д. 7, стр. 1, помещ. 1Н

Телефон: +7 (495) 510-28-79

Электронная почта: office.ru@bausch.com.

Прочие источники информации

Подробные сведения о данном препарате содержатся в едином реестре зарегистрированных лекарственных средств.

Листок-вкладыш доступен в едином реестре зарегистрированных лекарственных средств Евразийского экономического союза и на официальном сайте уполномоченного органа (экспертной организации) <https://grls.rosminzdrav.ru>.