

Торговое наименование

Неттависк

Международное непатентованное или группировочное наименование

Нетилмицин

Лекарственная форма

Мазь глазная

Состав

1 г. мази содержит:

Действующее вещество: нетилмицина сульфат– 4.55 мг (в пересчете на нетилмицин 3.00 мг);*Вспомогательные вещества:* парафин жидкий - 50 мг, ланолин - 150 мг, вода очищенная - 50 мг, парафин мягкий белый - до 1.0 г.**Описание**

Мазь светло-желтого цвета.

Фармакотерапевтическая группа

Средства, применяемые в офтальмологии; противомикробные средства; антибиотики.

Код АТХ: S01AA23

Фармакологические свойства*Фармакодинамика*

Нетилмицин - полусинтетический аминогликозидный бактерицидный антибиотик широкого спектра действия. Связывается с 30S субъединицей рибосом микроорганизмов и нарушает синтез белка, препятствуя образованию комплекса транспортной и информационной РНК, при этом происходит нарушение считывания генетического кода и образование нефункциональных белков; полирибосомы расщепляются и теряют способность синтезировать белок. Нетилмицин обладает высокой бактерицидной активностью в низких концентрациях (0.5-12 мкг/мл). В больших концентрациях снижает барьерные функции клеточных мембран и вызывает гибель микроорганизмов.

Высокоактивен в отношении грамотрицательных микроорганизмов (*Pseudomonas aeruginosa*, *Escherichia coli*, *Klebsiella spp.*, *Serratia spp.*, *Providencia spp.*, *Enterobacter spp.*, *Proteus mirabilis*, *Proteus vulgaris*, *Citrobacter spp.*, *Morganella morganii*, *Aeromonas spp.*, *Neisseria gonorrhoeae*, *Salmonella spp.*, *Shigella spp.*), а также некоторых грамположительных микроорганизмов (*Staphylococcus spp.*, в т.ч. устойчивых к другим аминогликозидам, пенициллину, метициллину, некоторым цефалоспорином), некоторых штаммов *Streptococcus spp.*

Фармакокинетика

При местном применении нетилмицина системная абсорбция и липофильность молекулы низкая, проникновение в переднюю камеру слабое. Проведенные исследования показывают, что после однократного применения концентрация нетилмицина в слезной жидкости составляет: через 5 мин 256 мкг/мл, через 10 мин 182 мкг/мл, через 20 мин 94 мкг/мл и 27 мкг/мл через 1 ч после применения.

Показания к применению

Лекарственный препарат Неттависк показан к применению у взрослых и детей с 3 лет для лечения инфекций век и наружных отделов глаза, вызванных чувствительными к нетилмицину микроорганизмами.

Противопоказания

- индивидуальная повышенная чувствительность к действующему веществу препарата или к каким-либо вспомогательным ингредиентам, входящим в его состав, а также другим аминогликозидам;
- детский возраст до 3 лет;
- беременность;
- период грудного вскармливания.

Применение при беременности и в период грудного вскармливания

Беременность

Применение при беременности противопоказано.

Лактация

При назначении препарата в период грудного вскармливания следует прекратить грудное вскармливание.

Фертильность

Отсутствуют данные о влиянии препарата на фертильность человека.

Влияние на способность управлять транспортными средствами, механизмами

Препарат оказывает влияние на способность управлять транспортными средствами и работать с механизмами.

После применения мази временно ухудшается острота зрения, что необходимо учитывать при вождении автомобиля и работе с механизмами.

Способ применения и дозы

Местно. Полоску мази длиной 0.5-1 см закладывают за нижнее веко 3-4 раза в день. Если применение глазной мази сочетается с применением глазных капель, содержащих нетилмицин, то достаточно применения мази 1 раз в день на ночь.

Необходимо избегать соприкосновения кончика тубы с глазом и другими поверхностями во избежание микробной контаминации препарата.

Побочное действие

Частота нежелательных реакций была оценена в соответствии с классификацией систем и органов MedDRA следующим образом: очень часто ($\geq 1/10$), часто ($\geq 1/100$, $<1/10$), нечасто ($\geq 1/1000$, $<1/100$), редко ($\geq 1/10000$, $<1/1000$), очень редко ($<1/10000$), неизвестно (частота не может быть определена на основе имеющихся данных).

- возможны появления жжения, зуда в глазу, конъюнктивальная инъекция.

Препарат хорошо переносится в рекомендованных дозах. Побочные эффекты наблюдались менее чем у 2% пациентов.

Передозировка

Сведения о передозировке препарата отсутствуют.

Взаимодействие с другими лекарственными препаратами

При местном применении взаимодействия препарата Неттависк с другими препаратами не выявлено.

Особые указания

Длительное местное применение антибиотиков может вызвать резистентность микроорганизмов или возникновение вторичной грибковой инфекции. В случае отсутствия клинического улучшения в течение относительно короткого периода времени или в случае появления признаков раздражения или сенсibilизации применение препарата необходимо прекратить и начать соответствующее лечение.

Форма выпуска

Мазь глазная 0.3 %.

По 5 г мази в алюминиевую тубу с пластмассовым наконечником, закрывающимся пластмассовым колпачком. Тубу вместе с инструкцией по применению в пачку картонную.

СООТВЕТСТВУЕТ ЭКСПЕРТНОМУ ОТЧЕТУ
от 19.11.2025 № 28838
(ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ 0002)

Условия хранения

При температуре не выше 25 °С.

Хранить в недоступном для детей месте.

Срок годности

2 года.

После вскрытия тубы препарат следует использовать в течение 28 дней.

Не использовать препарат после истечения срока годности, указанного на упаковке.

Условия отпуска

Отпускают по рецепту.

Держатель регистрационного удостоверения

СИФИ С.П.А.

Виа Эрколе Патти, 36, 95025, Ачи Сант-Антонио (КТ), Италия.

Производитель

СИФИ С.П.А. Виа Эрколе Патти, 36 (пос. Лавинайо), 95025, Ачи Сант-Антонио (КТ), Италия.

Организация, принимающая претензии потребителей

ООО «Бауш Хелс»,

Россия, 115093, г. Москва, ул. Павловская, д. 7, стр. 1, помещ. 1Н

Тел./Факс: +7 (495) 510-28-79