

**ИНСТРУКЦИЯ**  
по медицинскому применению лекарственного препарата  
**НЕТТАЦИН**

**Регистрационный номер:** ЛП-002024

**Торговое наименование:** Неттацин

**Международное непатентованное или группировочное наименование:** нетилмицин.

**Лекарственная форма:** капли глазные.

#### **Состав**

Состав на 100 мл:

Действующее вещество: нетилмицина сульфат – 0,455 г (количество, эквивалентное нетилмицину – 0,300 г);

вспомогательные вещества: натрия хлорид, бензалкония хлорид, вода очищенная.

#### **Описание**

Прозрачный бесцветный или слегка желтоватого цвета раствор.

#### **Фармакотерапевтическая группа**

Антибиотик-аминогликозид.

**Код АТХ:** S01AA23.

#### **Фармакологические свойства**

##### **Фармакодинамика**

Полусинтетический аминогликозидный антибиотик широкого спектра действия. Связывается с 30S субъединицей рибосом и нарушает синтез белка, препятствуя образованию комплекса транспортной и информационной РНК, при этом происходит нарушение считывания генетического кода и образование нефункциональных белков; полирибосомы расщепляются и теряют способность синтезировать белок. В больших концентрациях снижает барьерные функции клеточных мембран и вызывает гибель микроорганизмов.

Высокоактивен в отношении грамотрицательных микроорганизмов (*Pseudomonas aeruginosa*, *Escherichia coli*, *Klebsiella* spp., *Serratia* spp., *Providencia* spp., *Enterobacter* spp., *Proteus mirabilis*, *Proteus vulgaris*, *Citrobacter* spp., *Morganella morganii*, *Aeromonas* spp., *Neisseria gonorrhoeae*, *Salmonella* spp., *Shigella* spp.), а также некоторых грамположительных микроорганизмов (*Staphylococcus* spp., в т.ч. устойчивых к другим аминогликозидам, пенициллину, метициллину, некоторым цефалоспорином), некоторых штаммов *Streptococcus* spp.

##### **Фармакокинетика**

При местном применении нетилмицина системная абсорбция низкая. Проведенные исследования показывают, что после однократного применения концентрация нетилмицина в слезной жидкости составляет: через 5 минут 256 мкг/мл, через 10 минут 182 мкг/мл, через 20 минут 94 мкг/мл и 27 мкг/мл через 1 час после применения.

#### **Показания к применению**

Местное применение для лечения инфекций век и наружных отделов глаза, вызванных чувствительными к нетилмицину микроорганизмами.

#### **Противопоказания**

Индивидуальная повышенная чувствительность к компонентам препарата и другим аминогликозидам; детский возраст до 3 лет; беременность; период грудного вскармливания.

#### **Применение при беременности и в период грудного вскармливания**

Применение при беременности противопоказано. При назначении в период лактации грудное вскармливание следует прекратить.

### **Способ применения и дозы**

Местно. Закапывают в конъюнктивальный мешок по 1-2 капли 3 раза в день. Не допускать контакта конца флакона-капельницы с глазом или какой-либо другой поверхностью.

### **Побочное действие**

Побочные эффекты наблюдались менее чем у 2 % пациентов. Зарегистрированы случаи появления жжения, зуда в глазу, покраснения конъюнктивы глаза.

### **Передозировка**

Сведения о передозировке препарата отсутствуют.

### **Взаимодействие с другими лекарственными средствами**

При местном применении Неттацина фармакологические взаимодействия с другими препаратами незначительны. Совместное применение, особенно местное и в особенности внутриполостное с другими потенциальными нефро- и ототоксичными антибиотиками может увеличивать риск побочных эффектов. Увеличению нефротоксичности аминогликозидов способствует совместное или длительное применение с другими потенциально нефротоксичными препаратами, такими как цисплатин, полимиксин В, колистин, виомицин, стрептомицин, ванкомицин, другие аминогликозиды и некоторыми цефалоспоридами (цефалоридин) или сильнодействующими диуретиками, такими как этакриновая кислота и фуросемид.

### **Особые указания**

Длительное местное применение антибиотиков может вызвать резистентность микроорганизмов или возникновение вторичной грибковой инфекции.

В случае отсутствия клинического улучшения в течение относительно короткого периода времени или в случае появления признаков раздражения или сенсибилизации применение препарата необходимо прекратить и начать соответствующее лечение.

### **Влияние на способность управлять транспортными средствами, механизмами**

Не оказывает влияния на способность управлять транспортными средствами, механизмами.

### **Форма выпуска**

Капли глазные 0,3 %.

По 5 мл препарата во флакон-капельницу из полиэтилена низкой плотности, укупороженный полистироловым колпачком с пробойником. По 1 флакону вместе с инструкцией по применению в пачку картонную.

### **Условия хранения**

При температуре не выше 25°C.

Хранить в недоступном для детей месте.

### **Срок годности**

Срок годности

3 года.

После вскрытия флакона препарат следует использовать в течение 28 дней.

Не использовать препарат после истечения срока годности, указанного на упаковке.

### **Условия отпуска**

Отпускают по рецепту.

### **Владелец (держатель) регистрационного удостоверения**

СИФИ С.П.А.

Виа Эрколе Патти, 36, 95025, Ачи Сант-Антонио (КТ), Италия.

**Производитель**

СИФИ С.П.А.

Виа Эрколе Патти, 36 (пос. Лавинайо), 95025, Ачи Сант-Антонио (КТ), Италия.

**В случае необходимости претензии потребителей направлять по адресу**

ООО «Бауш Хелс»

Россия, 115093, г. Москва, ул. Павловская, д. 7, стр. 1, помещ. 1Н.

Телефон: +7 (495) 510-28-79